

การทำวัคซีนในสัตว์ปีก



โปรแกรมวัคซีนสำหรับไก่พื้นเมือง



อายุ	ชนิดวัคซีน		
	อหิวาต์เปิด-ไก่	ฝีดาษไก่	วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลม
7-10 วัน			✓
3-4 สัปดาห์			✓
5 สัปดาห์		✓	
6-8 สัปดาห์			✓
8 สัปดาห์	✓		
11 สัปดาห์	✓		
ทุก 3 เดือน	✓		✓
วิธีให้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ ใต้ผิวหนัง	แทงปีก	หยอดตา/จุ่ม



ตำแหน่งที่ฉีดวัคซีน

- ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ :** ใช้เข็มเบอร์ 21 ยาวครึ่งนิ้ว
 - บริเวณกล้ามเนื้อหน้าอก
 - บริเวณโคนขาหลัง (แต่ต้องระวังเนื่องจากกล้ามเนื้อขาหลังมีเส้นประสาทใหญ่พาดผ่าน)
- ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง :** ใช้เข็มเบอร์ 21 ยาวครึ่งนิ้วบริเวณหลังคอ
- หยอดตา :** ดึงหนังตาล่าง หยดวัคซีนด้วยหลอดหยดลงที่ตา
- หยอดจุ่ม :** ใช้นิ้วมือปิดจุ่มข้างหนึ่งแล้วหยดวัคซีนที่รูจุ่มข้างที่เหลือเมื่อไก่สูดวัคซีน แล้วจึงปล่อยนิ้ว
- แทงปีก :** ใช้เข็มรูปส้อมจุ่มวัคซีนในจุดที่พองผิวด้านของปีก ระหว่างเส้นเลือด

โปรแกรมวัคซีนสำหรับเป็ดและห่าน




อายุ	ชนิดวัคซีน	
	กาฬโรคเป็ด	อหิวาต์เปิด-ไก่
3-4 สัปดาห์	✓	
8 สัปดาห์		✓
5 สัปดาห์	✓	✓
6-8 สัปดาห์	✓	
วิธีให้	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ/ ใต้ผิวหนัง



วัคซีนและอุปกรณ์พื้นฐาน

- วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อกัน
- วัคซีนฝีดาษ
- วัคซีนนิวคาสเซิล
- วัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก
- ไซริงค์ 3 cc เข็มเบอร์ 21 หรือ 22
- อุปกรณ์หยอดจุ่ม
- เข็มแทงปีก

อุปกรณ์พื้นฐานและการทำวัคซีน



วัคซีนชนิดน้ำ ได้แก่ วัคซีนอหิวาต์เปิด - ไก่ เขย่าขวดให้เข้ากัน ใช้ไซริงค์ดูดวัคซีนปริมาณ 1 cc ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง

การเตรียมวัคซีน

- วัคซีนชนิดผง** ได้แก่ วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อกัน ฝีดาษไก่
- ผสมวัคซีน โดยใช้ไซริงค์ใส่หัวเข็มเบอร์ 21 ดูดน้ำยาละลายวัคซีน ประมาณ 1 cc
 - นำน้ำยาละลายตามข้อ 1 ใส่ขวดวัคซีน เขย่าขวดให้เข้ากัน
 - นำน้ำยาวัคซีนที่ผสมน้ำยาละลาย ตามข้อ 2 กลับมาใส่ขวดน้ำยาละลาย และเขย่าให้เข้ากันอีกครั้ง
 - วัคซีนรวมนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อกัน ใช้อุปกรณ์หยอดจุ่มปักลงในขวด แล้วนำไปหยอดจุ่มต่อไป
 - วัคซีนฝีดาษไก่ ใช้เข็มแทงปีกจุ่มลงไปในช่วงก่อนนำไปแทงปีก

