



โรคพิษสุนัขบ้า

รู้ไว้...ป้องกันได้



รักน้องหมา
อย่าลืมพาน้องไป **ฉีดวัคซีน**
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า **นะจ๊ะ**



โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากอะไร ?



โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส
ที่ชื่อว่าเรบีส์ไวรัส (Rabies virus)

สัตว์ชนิดใดที่สามารถเป็นโรค พิษสุนัขบ้าได้บ้าง



สัตว์ที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้
คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ซึ่งใน
ประเทศไทยพบการเกิดโรคในสุนัข
มากที่สุด

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจาก ทางไหนได้บ้าง

เชื้อไวรัสออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื
ส่วนใหญ่มัจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัดหรือ
ข่วน หรือเข้าทางเยื่อเมือก ปาก จมูก ที่มีแผลหรือ
รอยฉีกขาดได้ ซึ่งสุนัขหรือแมวสามารถแพร่เชื้อ
ผ่านทางน้ำลายได้ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการป่วย

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อเชื้อ เข้าสู่ร่างกายของคนแล้วจะเกิด อาการภายในกี่วัน ?




ไม่แน่นอน ระยะเวลาการเกิดโรค
ขึ้นอยู่กับบริเวณที่โดนกัดว่าใกล้เส้น
ประสาทและสมองมากน้อยเพียงใด

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้ว รักษาหายได้หรือไม่ ?



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่สามารถ
รักษาให้หายได้ หากเป็นแล้วจะเสียชีวิต
เท่านั้น สิ่งที่เราสามารถทำได้คือ
การป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน



สุนัขต้องได้รับการฉีด **วัคซีน** ครั้งแรกที่อายุ 12 สัปดาห์
เข็มที่สองฉีดหลังจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์
และหลังจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปี



อาการของสุนัขหรือแมวที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร

อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
มีแสดงอาการออกมาทั้งแบบ
ดุร้ายและแบบซึม ซึ่งแบบดุร้าย
จะสามารถสังเกตอาการได้ชัด
คือ สัตว์จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ดุร้ายมากขึ้น
สัตว์ที่โดยปกติจะชอบคลุกคลีกับคนก็จะเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นแยกตัวออกห่าง ชอบอยู่ในที่
เงียบๆ แสดงอาการทางระบบประสาท
กระวนกระวาย กัดแทะสิ่งของ กัดทุกสิ่งไม่
เลือกหน้า คางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้ำห้อยออก
นอกปาก

โรคพิษสุนัขบ้าพบเฉพาะ หน้าร้อนใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่
โรคพิษสุนัขบ้าสามารถ
พบได้ **ตลอดทั้งปี**

จะทำอย่างไรหากถูกสุนัข
หรือแมวที่สงสัยว่าเป็น
โรคพิษสุนัขบ้ากัด?

1 รีบล้างบริเวณ
แผลด้วย สบู่
"ทันที"




2 รีบไปพบแพทย์
เพื่อการวินิจฉัยและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคให้ทันท่วงที



3 รีบกักสัตว์
เพื่อเฝ้าระวัง
และติดตามอาการ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

การเก็บรักษาวัคซีน



วัคซีนจะต้องเก็บรักษา
ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส



ไม่นำวัคซีนไปแช่ในช่องแช่แข็ง
หรือช่องใต้ช่องแช่แข็ง และไม่นำ
วัคซีนมาวางทิ้งไว้นอกตู้เย็น



หลีกเลี่ยงไม่ให้วัคซีนสัมผัสกับแสงแดด



กรณีนำวัคซีนไปใช้ให้บรรจุลงในกล่อง
รักษาความเย็นหรือกระเป๋าวัดความเย็น
ที่สามารถรักษาความเย็นให้อยู่ในระดับ
2-8 องศาเซลเซียส

วัคซีนจะต้องไม่สัมผัสกับน้ำแข็ง
โดยตรง ต้องนำไปใส่ถุงพลาสติก
หรือภาชนะบรรจุที่ป้องกันการสัมผัส
น้ำโดยตรงก่อนบรรจุลงในกล่อง
รักษาความเย็น



กลุ่มควบคุมโรคสัตว์เลี้ยง
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2653 4444 ต่อ 4181-2 www.dld.go.th