



วิถีใหม่ **NEW NORMAL**



ห่างไกลจาก **พิษสุนัขบ้า**

หลีกเลี่ยงสัตว์เลี้ยงจาก **COVID-19**

ดูแลตนเองอย่างไร เพื่อห่างไกลพิษสุนัขบ้า ?

สังเกตอาการเริ่มต้นของสัตว์

- นิสัยเปลี่ยน อยู่ไม่นิ่ง
- เสียงเห่าหอนแปลก
- ม่านตาขยาย
- ลิ้นห้อย น้ำลายไหล



ทอ้งคาถา 5 ย.



อย่าแหย่



อย่าเหยียบ



อย่าแยก



อย่าหยิบ



อย่ายุ่ง

รีบทำทันทีเมื่อถูกสุนัขกัด



ล้างแผล



ใส่ยา



กักหมา



หาหมอ

ดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างไร เพื่อห่างไกล COVID-19 ?

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง



ผู้ที่มีอาการป่วย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับสัตว์เลี้ยง



2 M / 6 FT



ปรึกษา ขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัดทุกแห่ง



อย่าลืม !!



พาสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เข็มแรก

อายุ 2-3 เดือน

ครั้งที่ 2

อายุ 4 เดือน

กระตุ้นภูมิ

ทุกๆ 1 ปี



สายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3255-6888

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์