



การปลูกพืชอาหารสัตว์

การปลูกหญ้าแพงโกล่า



การปลูก ใช้ท่อนพันธุ์ อัตรา 250-300 กิโลกรัมต่อไร่

พื้นที่ลุ่ม ทำเทือกแบบนาหว่านน้ำตม ปรับระดับน้ำให้สูง 10-15 เซนติเมตร
หว่านท่อนพันธุ์ให้ทั่วแปลง แล้วนาบกดท่อนพันธุ์ให้จมน้ำ แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1
สัปดาห์ แล้วระบายน้ำออก

พื้นที่ดอน หลังจากไถพรวนแล้ว ชักร่องห่างกัน 30 เซนติเมตร ลึกประมาณ
10 เซนติเมตร วางท่อนพันธุ์ 3-5 ท่อน เรียงต่อกันเป็นแถว ใช้ดินกลบเล็กน้อย
และเหยียบให้แน่น



การปลูกหญ้าแพงโกลา ในพื้นที่นา





การปลูกในลักษณะที่ดอน



การปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์




การกำจัดและควบคุมวัชพืช

- กำจัดวัชพืชครั้งแรก หลังปลูก 3 – 4 สัปดาห์
- ครั้งต่อไป เมื่อสังเกตเห็นวัชพืชปะปน 1 – 2 ครั้ง



การเตรียมดิน





การไถโดยใช้ ฝาน 3 หรือฝาน 7 ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

การพรวนดินหลังการไถ







การใส่ปุ๋ยคอกรองพื้นก่อนการปลูก 2 ตัน/ไร่
หรือการใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 ร่วมอัตราส่วน 25 กก./ไร่



การเก็บต่อวัชพืชออกจากแปลง



การปลูกแบบปักท่อนพันธุ์

- ควรปลูกเป็นแถว
- ระยะระหว่างแถว x หลุม : 120 x 80 เซนติเมตร
หรือ 100 x 100 เซนติเมตร
- ตัดท่อนพันธุ์เฉียงเป็นท่อนๆ (1 ท่อนมี 2 ข้อ)
- ปักเฉียงทำมุมกับพื้นดิน 30 องศา
- ใส่ปุ๋ยรองพื้น สูตร 15-15-15
อัตรา 50-100 กก./ไร่ (ขึ้นอยู่กับคุณภาพของดิน)
- ใช้ท่อนพันธุ์อัตรา 400 กก./ไร่





ตัดท่อนพันธุ์ ให้มีข้อติดอยู่ 2 ข้อ




ปักไขว้ท่อนพันธุ์เอียง 30 องศา



ให้ 1 ข้อจมอยู่ในดินประมาณ 1-2 นิ้ว



การเตรียมท่อนพันธุ์



ระยะระหว่างแถว (A) x หลุม (B)
 120 x 80 เซนติเมตร หรือ
 100 x 100 เซนติเมตร

ปลูกด้วยท่อนพันธุ์หลุมละ 2 ท่อน
 ท่อนละ 2 ช่อ ปักเอียงไขว้เข้าหากัน





การปลูกลางนอนเป็นแถว/ปลูกแบบอ้อย เหมาะสำหรับน้ำแล้ง







การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ด้วยเครื่องปลูกอ้อย



