

วัคซีนสำหรับไก่ ของกรมปศุสัตว์

● วัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ (Combined Newcastle disease and Infectious bronchitis vaccine)



พร้อมน้ำยาละลายวัคซีนรวม นิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ขนาด 5 มล.

วัคซีนเชื้อเป็น ชนิดดูดแห้ง ขนาดบรรจุ 100 โด๊ส

ประกอบด้วยไวรัสนิวคาสเซิลสเตรนลาโซต้า และไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่


วิธีการใช้ : หยอดตาหรือจุมูก ตัวละ 2 หยด

ความคุ้มโรค ไก่จะมีความคุ้มโรคทั้งสอง ภายหลังจากได้รับวัคซีน 2 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 3 เดือน

โปรแกรมวัคซีนนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่



ไก่พื้นเมือง



* โปรแกรมวัคซีนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

● วัคซีนฝีดาษไก่ (Fowl Pox Vaccine)



พร้อมน้ำยาละลายวัคซีนฝีดาษไก่ขนาด 5 มล.


วัคซีนเชื้อเป็น ชนิดดูดแห้ง ขนาดบรรจุ 200 โด๊ส

ผลิตจากเชื้อไวรัสฝีดาษไก่

วิธีการใช้ : แหวงฟังกัดของปีก ตัวละ 1 ครั้ง

ไก่จะมีความคุ้มโรคภายหลังจากได้รับวัคซีน 2 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 1 ปี หลังจากทำวัคซีน 7-10 วัน จะเกิดตุ่มฝีบริเวณที่แหวงปีก และจะค่อยๆ แหวงหายไปภายใน 2 สัปดาห์

โปรแกรมวัคซีนฝีดาษไก่



การป้องกันโรคในไก่ที่เหมาะสม

- ทำวัคซีนสม่ำเสมอ
- มีระบบการกีดกันเชื้อโรคไม่ให้เชื้อเข้าในฟาร์มที่เหมาะสม (biosecurity)
- การจัดการโรงเรือนและสุขภาพสัตว์ให้เหมาะสม
- มีการกักโรคเมื่อนำไก่ใหม่เข้าฝูง
- ควบคุมพาหะนำโรค แมลงและสัตว์รบกวนในฟาร์ม

● วัคซีนอหิวาต์เปิด-ไก่ (Fowl Cholera Vaccine)



วัคซีนเชื้อตาย ชนิดน้ำ


ขนาดบรรจุ 100 โด๊ส

ผลิตจากเชื้อแบคทีเรีย *Pasteurella multocida* serotype 8:A

วิธีการใช้ : เปิด ไก่ และห่าน ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนัง ตัวละ 1 มล.

สัตว์จะมีความคุ้มโรคหลังฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์ และอยู่ได้นาน 3 เดือน

โปรแกรมวัคซีนอหิวาต์เปิด-ไก่



ข้อควรปฏิบัติในการทำวัคซีน

- น้ำยาละลายวัคซีนควรแช่เย็นก่อนจะผสมละลายวัคซีน
- วัคซีนที่ละลายแล้วต้องแช่เย็นตลอดเวลาและควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง
- ให้วัคซีนแก่สัตว์ที่มีสุขภาพดีเท่านั้น
- วัคซีนฝีดาษไก่ หลีกเลี่ยงการแหวงโดนหลอดเลือดบริเวณฟังกัดของปีก และไม่ควรทำวัคซีน 21 วันก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ หรือ 4 สัปดาห์ก่อนขึ้นไข่
- หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด
- ห้ามใช้สารเคมีฆ่าเชื้อกระบอฉีดและเข็มก่อนให้วัคซีน
- เก็บวัคซีนที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง